

参考答案

吉林省 2016 ~ 2017 学年度高中必修课程复习与检测
数学必修 1

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8
C	A	C	A	D	D	D	C
9	10	11	12	13	14	15	
A	A	C	D	C	D	A	

二、填空题

16. $a \leq 1$

17. 7

18. $\{y | 0 \leq y < 1\}$

19. 3

三、解答题

20. 解: (1) $f(x) = x^a$ 的图象经过点 $A(\frac{1}{2}, \sqrt{2})$,

$$\therefore (\frac{1}{2})^a = \sqrt{2},$$

$$\text{即 } 2^{-a} = 2^{\frac{1}{2}}, \text{解得 } a = -\frac{1}{2}.$$

(2) 证明: 任取 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, 且 $x_1 < x_2$, 则

$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^{-\frac{1}{2}} - x_1^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{x_2}} - \frac{1}{\sqrt{x_1}} = \frac{\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}}{\sqrt{x_1} \sqrt{x_2}} = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{x_1} \sqrt{x_2}}.$$

$$\because x_2 > x_1 > 0, \therefore x_1 - x_2 < 0, \sqrt{x_1} \sqrt{x_2} > 0, \text{于是 } f(x_2) - f(x_1) < 0.$$

即 $f(x_2) < f(x_1)$, 所以 $f(x) = x^{-\frac{1}{2}}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内是减函数.

21. 解: (1) $f(x)$ 的单调增区间为 $[-2, 0), (2, +\infty)$, 单调减区间为 $(-\infty, -2], (0, 2]$.

(2) $\because f(x) = 16$, $\therefore (x+2)^2 = 16$, $\therefore x = 2$ (舍) 或 -6 ; 或 $(x-2)^2 = 16$, $\therefore x = 6$ 或 -2 (舍).

$\therefore x$ 的值为 6 或 -6 .

22. 解: 令 $t = \log_y x$, $\because x > 1, y > 1$, $\therefore t > 0$,

$$\text{由 } 2\log_y y - 2\log_y x + 3 = 0 \text{ 得 } 2t - \frac{2}{t} + 3 = 0,$$

$$\therefore 2t^2 + 3t - 2 = 0,$$

$$\therefore (2t-1)(t+2) = 0, \because t > 0, \therefore t = \frac{1}{2},$$

$$\text{即 } \log_y y = \frac{1}{2}, \therefore y = x^{\frac{1}{2}},$$

$$\therefore T = x^2 - 4y^2 = x^2 - 4x = (x-2)^2 - 4,$$

$$\because x > 1, \therefore \text{当 } x = 2 \text{ 时, } T_{\min} = -4.$$

23. 解: (1) 用待定系数法不难得得到

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}x + 22, & (1 \leq x < 40, x \in \mathbb{N}), \\ -\frac{1}{2}x + 52, & (40 \leq x \leq 100, x \in \mathbb{N}). \end{cases}$$

(2) 设日销售额为 S 千元, 当 $1 \leq x < 40$ 时,

$$S = (\frac{1}{4}x + 22)(-\frac{1}{3}x + \frac{109}{3}) = -\frac{1}{12}(x - \frac{21}{2})^2 + \frac{38809}{48},$$

当 $x = 10$ 或 11 时,

$$S_{\max} = \frac{9702}{12} = 808.5 \text{ (千元)},$$

当 $40 \leq x \leq 100$ 时,

$$S = (-\frac{1}{2}x + 52)(-\frac{1}{3}x + \frac{109}{3}) = \frac{1}{6}(x^2 - 213x + 11336),$$

$\therefore x = 40$ 时, $S_{\max} = 736$ (千元).


综上分析, 日销售额最高是在第 10 天或第 11 天, 最高值为 808.5 千元.

24. 解: (1) 常数 $m = 1$.

(2) 当 $k < 0$ 时, 直线 $y = k$ 与函数 $y = |3^x - 1|$ 的图象无交点, 即方程无解;

当 $k = 0$ 或 $k \geq 1$ 时, 直线 $y = k$ 与函数 $y = |3^x - 1|$ 的图象有唯一的交点, 所以方程有一解;

当 $0 < k < 1$ 时, 直线 $y = k$ 与函数 $y = |3^x - 1|$ 的图象有两个不同交点, 所以方程有两解.



吉林省 2016 ~ 2017 学年度高中必修课程复习与检测

数学必修 2

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8
B	C	D	B	A	D	B	C
9	10	11	12	13	14	15	
A	D	C	B	A	B	A	

二、填空题

16. $x + 2y - 2 = 0$

17. (1, 2)

18. $-3, 2$

19. ②③

三、解答题

20. 解: 设直线 l 的方程为 $y + 4 = k(x + 5)$,

分别令 $y = 0, x = 0$,

得 l 在 x 轴, y 轴上的截距为: $a = -\frac{5k+4}{k}, b = 5k+4$,

由条件(2)得 $ab = \pm 10$, $\therefore -\frac{5k+4}{k} \cdot (5k+4) = \pm 10$,

得 $25k^2 - 30k + 16 = 0$, 无实数解;

或 $25k^2 - 50k + 16 = 0$, 解得 $k_1 = \frac{8}{5}, k_2 = \frac{2}{5}$.

故所求的直线方程为: $8x - 5y + 20 = 0$,

或 $2x - 5y - 10 = 0$.

21. 解: 坐标原点到这两条直线的距离相等且 $l_1 \parallel l_2$,

$\therefore l_1, l_2$ 在 y 轴上的截距互为相反数, 即 $\frac{4}{b} = -2$,

$$\therefore b = -2.$$

即有 $l_1: ax + 2y + 4 = 0$ 与 $l_2: (a-1)x + y - 2 = 0$.

$\because l_1 \parallel l_2$, 且 l_1, l_2 斜率存在, $\therefore -\frac{a}{2} = -(a-1)$, 解之得 $a = 2$. 综上: $a = 2, b = -2$.

22. 解: 据题意设圆心 $C(a, 0)$,

圆 C 方程为 $(x-a)^2 + y^2 = r^2$,

则有 $\begin{cases} (1-a)^2 = r^2, \\ \frac{|a-1|}{2} = \sqrt{r^2 - 3}. \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} r = 2, \\ a = -1 \text{ 或 } 3. \end{cases}$

\therefore 所求圆 C 的标准方程为: $(x+1)^2 + y^2 = 4$, 或 $(x-3)^2 + y^2 = 4$.

23. 解: (1) 由 AC 边上的高 BH 所在直线方程为 $x - 2y - 5 = 0$ 可知 $k_{AC} = -2$, 又 $A(5, 1)$, AC 边所在直线方程为 $y - 1 = -2(x - 5)$,

即 AC 边所在直线方程为 $2x + y - 11 = 0$.

(2) 由 AC 边所在直线方程为 $2x + y - 11 = 0$, AB 边上的中线 CM 所在直线方程为 $2x - y - 5 = 0$,

由 $\begin{cases} 2x + y - 11 = 0, \\ 2x - y - 5 = 0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = 4, \\ y = 3. \end{cases}$

所以顶点 C 的坐标为 $(4, 3)$.

24. 解: (1) 连结 PO ,

$\because P, O$ 分别为 SB, AB 的中点, $\therefore PO \parallel SA$,

$PO \subset$ 平面 PCD ,

$SA \not\subset$ 平面 PCD .

(2) $r = 2$,

母线 $l = SB = 2\sqrt{2}$,

$$\therefore S_{底} = \pi r^2 = 4\pi,$$

$$S_{侧} = \pi rl = 4\sqrt{2}\pi,$$

$$\therefore S_{表} = S_{底} + S_{侧} = 4(\sqrt{2} + 1)\pi.$$

(3) $\because PO \parallel SA$, $\therefore \angle DPO$ 为异面直线 SA 与 PD 所成角,

$\because CD \perp AB, CD \perp SO, AB \cap SO = O$,

$\therefore CD \perp$ 平面 SOB ,

$\therefore OD \perp PO$.

在 $Rt\triangle DOP$ 中, $OD = 2, OP = \frac{1}{2}SB = \sqrt{2}$,

$$\therefore \tan \angle DPO = \frac{OD}{OP} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2},$$

\therefore 异面直线 SA 与 PD 所成角的正切值为 $\sqrt{2}$.

吉林省 2016 ~ 2017 学年度高中必修课程复习与检测

数学必修 3

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8
D	C	B	B	D	A	C	C
9	10	11	12	13	14	15	
A	B	C	A	C	B	D	

二、填空题

16. 45

17. $\frac{17}{25}$

18. 4

19. $\frac{2}{3}$

三、解答题

20. 解: (1) $\because \frac{x}{2000} = 0.19$, $\therefore x = 380$.

(2) 初三年级人数为 $y + z = 2000 - (373 + 377 + 380 + 370) = 500$, 现用分层抽样的方法在校抽取

48 名学生, 应在初三年级抽取的人数为: $\frac{48}{2000} \times 500 = 12$ 名.

(3) 设初三年级女生比男生多的事件为 A , 初三年级女生男生数记为 (y, z) ;

由(2)知 $y + z = 500$, 且 $y, z \in \mathbb{N}$, 基本事件空间包含的基本事件有:

(245, 255)、(246, 254)、(247, 253)、……、(255, 245) 共 11 个,

事件 A 包含的基本事件有: (251, 249)、(252, 248)、(253, 247)、(254, 246)、(255, 245) 共 5 个.

$$\therefore P(A) = \frac{5}{11}.$$

21. 解: (1) 如表.

分组	频数	频率

$P(A) = \frac{S_{10}}{S} \times (1 - 0.4) = \frac{10^2\pi}{40^2\pi} \times 0.6 = \frac{1}{16} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{80}$,
所以这位同学投掷一次中 10 环的概率为 $\frac{3}{80}$.

(2) 记事件 $B = \{\text{投掷一次不到 } 9 \text{ 环}\}$,
事件 B 发生, 飞镖落在 7、8 环或靶外, 因此由几何概型的求概率公式得

$$\begin{aligned} P(B) &= 0.4 + \frac{S - S_{10+9}}{S} \times (1 - 0.4) \\ &= 0.4 + \frac{40^2\pi - 20^2\pi}{40^2\pi} \times 0.6 \\ &= \frac{2}{5} + \frac{3}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{17}{20}, \end{aligned}$$

所以这位同学投掷一次不到 9 环的概率为 $\frac{17}{20}$.

23. 解: (1) 因为间隔时间相同, 故是系统抽样.

甲		乙	
8	7	2	7
			8
6	8	2	8

(3) 因为 $\bar{x}_{\text{甲}} = \frac{1}{5}(86 + 72 + 92 + 78 + 77) = 81$,

$\bar{x}_{\text{乙}} = \frac{1}{5}(82 + 92 + 78 + 95 + 88) = 87$, 所以

$$S_{\text{甲}}^2 = \frac{1}{5}(5^2 + 9^2 + 11^2 + 3^2 + 4^2) = 50.4,$$

$$S_{\text{乙}}^2 = \frac{1}{5}(5^2 + 5^2 + 9^2 + 8^2 + 1^2) = 39.2.$$

而 $S_{\text{甲}}^2 > S_{\text{乙}}^2$, 所以乙车间产品较稳定.

24. 解: (1) 直线 l_1 的斜率 $k_1 = \frac{1}{2}$, 直线 l_2 的斜率 $k_2 = \frac{a}{b}$.
设事件 A 为“直线 $l_1 \cap l_2 = \emptyset$ ”.

$a, b \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 的总事件数为 $(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6), (2, 1), (2, 2), \dots, (2, 6), \dots, (5, 6), (6, 6)$ 共 36 种. 若 $l_1 \cap l_2 = \emptyset$, 则 $l_1 \parallel l_2$, 即 $k_1 = k_2$, 即 $b = 2a$.

满足条件的实数对 (a, b) 有 $(1, 2), (2, 4), (3, 6)$ 共三种情形.

所以 $P(A) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$. 答: 直线 $l_1 \cap l_2 = \emptyset$ 的概率为 $\frac{1}{12}$.

(2) 设事件 B 为“直线 l_1 与 l_2 的交点位于第一象限”, 由于直线 l_1 与 l_2 有交点, 则 $b \neq 2a$.

$$\begin{cases} ax - by + 1 = 0, \\ x - 2y - 1 = 0. \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} x = \frac{b+2}{b-2a}, \\ y = \frac{a+1}{b-2a}. \end{cases}$$

因为直线 l_1 与 l_2 的交点位于第一象限, 则 $\begin{cases} x > 0, \\ y > 0. \end{cases}$

$$\begin{cases} x = \frac{b+2}{b-2a} > 0, \\ y = \frac{a+1}{b-2a} > 0. \end{cases} \quad \text{解得} \quad b > 2a.$$

$a, b \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 的总事件数为 $(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6), (2, 1), (2, 2), \dots, (2, 6), \dots, (5, 6), (6, 6)$ 共 36 种.

满足条件的实数对 (a, b) 有 $(1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 5), (2, 6)$ 共六种.

$$\text{所以 } P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

答: 直线 l_1 与 l_2 的交点位于第一象限的概率为 $\frac{1}{6}$.

数学必修 4

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8
A	B	A	C	A	C	C	A
9	10	11	12	13	14	15	
A	C	D	A	D	B	D	

二、填空题

16. $\frac{4}{3}$

17. 3

18. 直角三角形

19. ②

三、解答题

20. 解: ∵ $\mathbf{a} = (1, 1), \mathbf{b} = (2, x)$,

$$\therefore \mathbf{a} + \mathbf{b} = (3, 1+x), 4\mathbf{b} - 2\mathbf{a} = (6, 4x-2),$$

由于 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 与 $4\mathbf{b} - 2\mathbf{a}$ 平行,

$$\text{得 } 6(x+1) - 3(4x-2) = 0,$$

解得 $x = 2$.

$$21. \text{解: (1) } \because \tan \frac{\alpha}{2} = 2, \tan \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \times 2}{1 - 2^2} = -\frac{4}{3},$$

$$\therefore \tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha} = \frac{1 - \frac{4}{3}}{1 + \frac{4}{3}} = -\frac{1}{7}.$$

$$(2) \frac{6\sin \alpha + \cos \alpha}{3\sin \alpha - 2\cos \alpha} = \frac{\cos \alpha}{3\sin \alpha - 2\cos \alpha} = \frac{6\tan \alpha + 1}{3\tan \alpha - 2}$$

$$= \frac{6 \times (-\frac{4}{3}) + 1}{3 \times (-\frac{4}{3}) - 2} = \frac{7}{6}.$$

22. 解: (1) $f(x) = \sqrt{3}\sin \omega x + \cos \omega x = 2\sin(\omega x + \frac{\pi}{6})$,

由题设知 $f(x)$ 的周期为 $T = \pi$, ∴ $\omega = \frac{2\pi}{\pi} = 2$,

$$\therefore f(x) = 2\sin(2x + \frac{\pi}{6}),$$

由 $2k\pi - \frac{\pi}{2} \leqslant 2x + \frac{\pi}{6} \leqslant 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ 得,

$$k\pi - \frac{\pi}{3} \leqslant x \leqslant k\pi + \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}$$

∴ $f(x)$ 的单调递增区间为 $[k\pi - \frac{\pi}{3}, k\pi + \frac{\pi}{6}]$, ($k \in \mathbb{Z}$).

$$(2) \because -\frac{\pi}{6} \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2},$$

$$\therefore -\frac{\pi}{6} \leqslant 2x + \frac{\pi}{6} \leqslant \frac{7\pi}{6},$$

$$\therefore -\frac{1}{2} \leqslant \sin(2x + \frac{\pi}{6}) \leqslant 1,$$

$$\therefore -1 \leqslant 2\sin(2x + \frac{\pi}{6}) \leqslant 2,$$

∴ $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ 上的最大值为 2, 最小值为 -1.

23. 解: 由 $f(x) = \cos(2x + \frac{\pi}{3}) + \sin^2 x = \cos 2x \cos \frac{\pi}{3} - \sin 2x \sin \frac{\pi}{3} + \frac{1 - \cos 2x}{2}$

$$= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x,$$

$$\text{则 } f(\frac{c}{2}) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin c = -\frac{1}{4}, \text{ 所以 } \sin c = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

因为 C 为锐角, 所以 $C = \frac{\pi}{3}$,

又因为在 $\triangle ABC$ 中, $\cos B = \frac{1}{3}$, 所以 $\sin B = \frac{2\sqrt{2}}{3}$,

$$\text{所以 } \sin A = \sin(B+C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C = \frac{2}{3}\sqrt{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2\sqrt{2} + \sqrt{3}}{6}.$$

24. 解: (1) 由 $\mathbf{a} \perp (\mathbf{b} - 2\mathbf{c})$ 得

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} - 2\mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 0,$$

$$\text{即 } 4\sin(\alpha+\beta) - 8\cos(\alpha+\beta) = 0, \tan(\alpha+\beta) = 2.$$

$$(2) \mathbf{b} + \mathbf{c} = (\sin \beta + \cos \beta, 4\cos \beta - 4\sin \beta),$$

$$|\mathbf{b} + \mathbf{c}|^2 = \sin^2 \beta + 2\sin \beta \cos \beta + \cos^2 \beta + 16\cos^2 \beta - 32\cos \beta \sin \beta + 16\sin^2 \beta$$

$$= 17 - 30\sin \beta \cos \beta = 17 - 15\sin 2\beta,$$

最大值为 32, 所以 $|\mathbf{b} + \mathbf{c}|$ 的最大值为 $4\sqrt{2}$.

吉林省 2016 ~ 2017 学年度高中必修课程复习与检测

数学必修 5

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8
B	A	D	A	C	B	A	D
9	10	11	12	13	14	15	
D	D	B	B	C	A	A	

二、填空题

16. 120°

17. $3\sqrt{3}$ m

18. 10

$$19. \begin{cases} 2, (n=1) \\ -4n+5, (n \geq 2) \end{cases}$$

三、解答题

20. 解: (1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d .

$$\text{因为 } a_3 = -6, a_6 = 0, \text{ 所以 } \begin{cases} a_1 + 2d = -6 \\ a_1 + 5d = 0 \end{cases},$$

解得 $a_1 = -10, d = 2$,

$$\text{所以 } a_n = -10 + (n-1) \cdot 2 = 2n - 12.$$

(2) 设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q ,

$$\text{因为 } b_2 = a_1 + a_2 = -24, b_1 = -8,$$

$$\text{所以 } -8q = -24, \text{ 即 } q = 3,$$

所以 $\{b_n\}$ 的前 n 项和公式为

$$S_n = \frac{b_1(1 - q^n)}{1 - q} = 4(1 - 3^n).$$

21. 解: 过 A 作垂线 AD 交 CB 于 D , 则在 $\text{Rt}\triangle ADB$ 中,

$$\angle ABD = \alpha, AB = \frac{h}{\sin \alpha}.$$

又在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = \beta, \angle BAC = \alpha - \beta$,

$$\begin{aligned} \text{由正弦定理, 得 } \frac{BC}{\sin(\alpha-\beta)} &= \frac{AB}{\sin \beta}, \text{ 即} \\ BC &= \frac{AB \cdot \sin(\alpha-\beta)}{\sin \beta} = \frac{h \cdot \sin(\alpha-\beta)}{\sin \alpha \cdot \sin \beta} \\ &= \frac{100 \cdot \sin(60^\circ - 30^\circ)}{\sin 60^\circ \cdot \sin 30^\circ} = \frac{200\sqrt{3}}{3} (\text{米}). \end{aligned}$$

22. 解: (1) 设行车所用时间为 $t = \frac{130}{x}$ 小时,

$$\text{则 } y = \frac{130}{x} \cdot 6 \cdot (2 + \frac{x^2}{360}) + \frac{18 \times 130}{x}$$

$$= 130 \cdot (\frac{30}{x} + \frac{6 \cdot x^2}{360x}) = 130 \cdot (\frac{30}{x} + \frac{x}{60}),$$

$x \in [40, 100]$.

(2) 由(1)可知

$$y = 130 \cdot (\frac{30}{x} + \frac{x}{60}) \geqslant 130 \times 2\sqrt{\frac{30}{x} \times \frac{x}{60}},$$

即 $y_{\min} = 130\sqrt{2}$,

当且仅当 $x = 30\sqrt{2}$ (km/h) 时, 函数取最小值.

23. 解: (1) <math

$$\frac{\sin A}{\cos A} = \sqrt{3}$$

(2)由余弦定理,得 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A = 9 + 4 - 2 \times 3 \times 2 \times \frac{1}{2} = 7$. $\therefore a = \sqrt{7}$.

21. 解:(1) $\{a_n\}$ 是等比数列,设公比为 q , $\therefore a_1 = a_1 q^3$,

$$\therefore 8 = q^3, \therefore q = 2.$$

$$\therefore a_n = 2^{n-1}.$$

$$(2) \because q = 2, \therefore S_6 = \frac{1 - 2^6}{1 - 2} = 63.$$

22.解:(1)证明: $\because SA \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \subset$ 平面 $ABCD$, $AB \perp SA$.

又四边形 $ABCD$ 为正方形, $AB \perp AD$, $SA \cap AD = A$, $\therefore AB \perp$ 平面 SAD .

(2) $\because AB \parallel CD$, $\therefore \angle SCD$ 为异面直线 AB 与 SC 所成的角,

$\because AB \perp$ 平面 SAD , $CD \parallel AB$, $\therefore CD \perp$ 平面 SAD , $\therefore CD \perp SD$, $\therefore \angle SDC = 90^\circ$.

在 Rt $\triangle SDC$ 中, $CD = AB = 1$, $SD = \sqrt{3}$,

$$\therefore \tan \angle SCD = \sqrt{3}, \therefore \angle SCD = 60^\circ$$

\therefore 异面直线 AB 与 SC 所成的角为 60° .

23.解:(1)当 $k = 3$ 时,直线 l 的方程为 $y = 3x + 1$.

设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,由 $\begin{cases} y = 3x + 1, \\ x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0, \end{cases}$ 得 $5x^2 - 4x - 1 = 0$.

解得 $x_1 = 1$, $x_2 = -\frac{1}{5}$.代入 $y = 3x + 1$,

得 $y_1 = 4$, $y_2 = \frac{2}{5}$. $\therefore A(1, 4)$, $B(-\frac{1}{5}, \frac{2}{5})$,

$$\therefore |AB| = \sqrt{(1 + \frac{1}{5})^2 + (4 - \frac{2}{5})^2} = \frac{6\sqrt{10}}{5}.$$

(2)由 $|AB| = \sqrt{(1 + \frac{1}{5})^2 + (4 - \frac{2}{5})^2} = \frac{6\sqrt{10}}{5}$,

$$\therefore (x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0,$$

$$\therefore (x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0,$$

$$\therefore (x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0,$$

$$\therefore (x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0,$$

得 $(1 + k^2)x^2 - 2(k + 1)x - 2 = 0$.

\therefore 判别式 $\Delta = 4(k + 1)^2 + 8(1 + k^2) > 0$,

\therefore 方程组有两个不同的解,

\therefore 直线 l 恒与圆 C 相交.

24.解:(1) $\because a \geq b > c$, $\therefore 3c < a + b + c < 3a$.

$$\therefore a + b + c = 0, \therefore a > 0, c < 0.$$

$$\therefore ax^2 + 2bx + c = 0,$$

$$\text{判别式 } \Delta = 4b^2 - 4ac = 4(-a - c)^2 - 4ac$$

$$= 4(a^2 + c^2 + ac) = 4 \left[(a + \frac{c}{2})^2 + \frac{3}{4}c^2 \right],$$

$$\therefore a > 0, c < 0, \therefore \Delta > 0,$$

\therefore 方程 $ax^2 + 2bx + c = 0$ 有两个不等实根,

即函数 $f(x)$ 有两个零点.

(2)函数 $f(x)$ 图象的对称轴为 $x = -\frac{b}{a} = \frac{a+c}{a}$

$$= 1 + \frac{c}{a},$$

$$\therefore a > 0, c < 0, \therefore 1 + \frac{c}{a} < 1,$$

$\therefore f(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上是增函数,

$\therefore f(x)$ 在 $[1, 3]$ 上的最小值为 $f(1)$,最大值为 $f(3)$.

$$\begin{aligned} &\text{综上,得} \begin{cases} a + b + c = 0, \\ a + 2b + c = 1, \\ 9a + 6b + c = 13. \end{cases} \quad \begin{cases} a = 1, \\ b = 1, \\ c = -2. \end{cases} \end{aligned}$$

吉林省 2016 ~ 2017 学年度高中必修课程复习与检测

数学综合 2

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8
A	B	D	A	C	C	D	D
9	10	11	12	13	14	15	
C	B	B	C	D	C	D	

二、填空题

16. $>$

17. 1

18. 20

19. 3

三、解答题

20.解:(1) $\triangle ABC$ 中, $\tan B = -\sqrt{3}$, $\therefore B = 120^\circ$,

$$\therefore \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos B = -\frac{1}{2}.$$

(2)由余弦定理,得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2accosB$
 $= 9 + 4 - 2 \times 3 \times 2 \times (-\frac{1}{2}) = 19$.

$$\therefore b = \sqrt{19}.$$

21.解:(1)证明: $\because a_{n+1}^2 + 4a_{n+1}a_n + 4a_n^2 = 0$,

$$\therefore (a_{n+1} + 2a_n)^2 = 0,$$

$$\therefore a_{n+1} = -2a_n (n \in \mathbb{N}^*)$$

$\therefore \{a_n\}$ 是等比数列.

(2)由(1)知 $\{a_n\}$ 是等比数列, $a_1 = 1$,公比 $q = -2$,
 $\therefore S_8 = \frac{a_1(1 - q^8)}{1 - q} = \frac{1 - (-2)^8}{1 - (-2)} = -\frac{255}{3}$.

22.解:(1) \because 正方体的棱长为 1,

$$\therefore V_{B-ADD_1} = \frac{1}{3}S_{ADD_1} \cdot AB = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{6}.$$

(2) $\because P, Q$ 分别为 AB, BD_1 的中点, $\therefore AD_1 \parallel PQ$,

又 $\because AA_1 \parallel CC_1$,

$\therefore \angle A_1AD_1$ 为异面直线 PQ 与 CC_1 所成的角.

在 $\triangle A_1AD_1$ 中, $\because A_1A \perp A_1D_1, A_1A = A_1D_1$,

$$\therefore \angle A_1AD_1 = 45^\circ$$

\therefore 异面直线 PQ 与 CC_1 所成的角为 45° .

23.解:(1) $\because l_1 \perp l_2$,且 l_1 的斜率 $k_1 = 2$,

$$\therefore l_2$$
 的斜率存在且不为 0,且 $k_2 = -\frac{1}{2}$,

又 $l_1 \perp l_2$, $\therefore k_1k_2 = -1$.

$$\text{即 } 2 \cdot (-\frac{1}{2}) = -1, \therefore a = 2.$$

$\therefore l_1 \perp l_2$ 时, $a = 2$.

(2)解法一:

\because 圆心 $C(2, 1)$,直线 l_1 与圆 C 相切,

\therefore 点 C 到直线 l_1 的距离等于半径 r ,

$$r = \frac{|2 \times 2 + 1 \times (-1) + 2|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

\therefore 直线 l_1 与圆 C 相切时, $r = \sqrt{5}$.

解法二:

$y = 2x + 2$ 代入圆 C 的方程,整理得:

$$5x^2 + 5 - r^2 = 0.$$

\therefore 直线 l_1 与圆 C 相切时, $r = \sqrt{5}$.

24.解:(1) $\because f(x)$ 的一个零点为 1,

$$\therefore f(1) = 0$$
,即 $1 - 2a + 2 - a = 0$, $\therefore a = 1$.

(2)由已知,函数 $f(x)$ 的图象开口向上,对称轴为 $x = a$.

①当 $a < 0$ 时, $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是增函数,因此,

$$f(x)$$
 在 $[0, +\infty)$ 上的最小值为 $f(0) = 2 - a$,

$$\therefore 2 - a \geq 0, \therefore a \leq 2.$$

又 $a < 0$, $\therefore a < 0$.

②当 $a \geq 0$ 时, $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上的最小值为

$$f(a) = -a^2 - a + 2, \therefore -a^2 - a + 2 \geq 0, \therefore -2 \leq a \leq 1.$$

又 $a \geq 0$, $\therefore 0 \leq a \leq 1$.

综上所述, a 的取值范围是 $a \leq 1$.

为 $0.01 \times 10 = 0.1$,在这次测验中成绩优秀的人数为 $40 \times 0.1 = 4$ (人).

(2)设李明被抽中为事件 A ,从成绩优秀的学生中任意抽取两名学生共有 6 个基本事件,事件 A 包含 3 个基

本事件, $\therefore P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

即李明被抽中的概率为 $\frac{1}{2}$.

23.解:(1)圆 $x^2 + y^2 = 6$ 的圆心 $O(0, 0)$,半径 $R = \sqrt{6}$,

解法一:取 AB 中点 C ,连结 OC ,则 $OC \perp AB$.

$$3\sqrt{2}$$

$$\therefore \sin \angle AOC = \frac{|AC|}{|OA|} = \frac{\frac{3\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$\therefore \angle AOC = 60^\circ$, $\therefore \angle AOB = 120^\circ$.

解法二:在 $\triangle AOB$ 中,由余弦定理得

$$\cos \angle AOB = \frac{(\sqrt{6})^2 + (\sqrt{6})^2 - (3\sqrt{2})^2}{2 \times \sqrt{6} \times \sqrt{6}} = -\frac{1}{2},$$

$\therefore \angle AOB = 120^\circ$.

(2)设 $l: y = kx + 2$.即 $kx - y + 2 = 0$,

解法一:

$\because OA \perp OB$, $\therefore \triangle AOB$ 为等腰直角三角形,

\therefore 圆心 O 到 l 的距离为 $d = \sqrt{3}$,

$$\therefore \frac{2}{\sqrt{k^2 + 1}} = \sqrt{3}, \text{解得 } k = \pm \frac{\sqrt{3}}{3},$$

\therefore 直线 l 的方程为 $x - \sqrt{3}y + 2\sqrt{3} = 0$ 或 $x + \sqrt{3}y - 2\sqrt{3} = 0$.

解法二:

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,将 $y = kx + 2$ 代入 $x^2 + y^2 = 6$,

$$\therefore d^2 = x_1^2 + y_1^2 = (1 + k^2)x_1^2 + 4kx_1 + 4 = (1 + k^2)(x_1 + 2)^2 = \frac{4}{1 + k^2}(x_1 + 2)^2,$$

$$\therefore x_1 + x_2 = \frac{-4k}{1 + k^2}, x_1 \cdot x_2 = \frac{-2}{1 + k^2}.$$

由 $OA \perp OB$ 得 $x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 = 0$,

$$\therefore x_1 \cdot x_2 + (kx_1 + 2)(kx_2 + 2) = 0,$$

$$\therefore (1 + k^2)x_1 \cdot x_2 + 2k(x_1 + x_2) + 4 = 0,$$

$$\therefore (1 + k^2) \frac{-2}{1 + k^2} + 2k \cdot \frac$$

$\therefore 2a + 1 < g(x) < 1$,
由题意,只需 $2a + 1 \geq 0$, $\therefore -\frac{1}{2} \leq a < 0$.
综上所述, a 的取值范围为 $a \geq -\frac{1}{2}$.
解法二:
 $a(x^2 - x) > -1$,
 $\therefore x^2 - x = (x - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} \in (0, 2)$,
 $\therefore a > \frac{1}{x^2 - x} = \frac{1}{-(x - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}}$, $x \in (1, 2)$.
而 $-(x - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4} \in (-2, 0)$,
 $\therefore \frac{1}{-(x - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}} \in (-\infty, -\frac{1}{2})$.
 \therefore 只需 $a \geq -\frac{1}{2}$.

吉林省 2016 ~ 2017 学年度高中必修课程复习与检测

数学综合 4

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8
B	D	C	A	B	D	A	B
9	10	11	12	13	14	15	
C	A	B	C	C	D	D	

二、填空题

16. $\frac{3}{5}$

17. 90

18. -2

19. ③④

三、解答题

20. 解:(1)解法一:因为 $\frac{1}{2}\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}\cos A$, 所以 $\tan A = \sqrt{3}$,
又 $0 < A < \pi$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$.

解法二:因为 $\sin A \cos \frac{\pi}{3} - \cos A \sin \frac{\pi}{3} = 0$,

所以 $\sin(A - \frac{\pi}{3}) = 0$.

又 $-\frac{\pi}{3} < A - \frac{\pi}{3} < \frac{2}{3}\pi$, 所以 $A - \frac{\pi}{3} = 0$. 即 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2)根据正弦定理,得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$,

所以 $b = \frac{a \cdot \sin B}{\sin A} = \frac{\sqrt{3} \times \sin \frac{\pi}{4}}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{2}$.

21. 解:(1)证明:因为 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 为正方体,
所以 $A_1B_1 \perp$ 平面 BCC_1B_1 .

又 $BC_1 \subset$ 平面 BCC_1B_1 , 所以 $A_1B_1 \perp BC_1$.

又 $BC_1 \perp B_1C$, 且 $A_1B_1 \cap B_1C = B_1$,


所以 $BC_1 \perp$ 平面 A_1B_1CD . 即 $BE \perp$ 平面 A_1B_1CD .

(2)若 $AB = 1$, 则矩形 A_1B_1CD 的面积为 $\sqrt{2}$.

又 $BE = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 BE 为棱锥 $B-A_1B_1CD$ 的高,

所以 $V_{B-AB_1CD} = \frac{1}{3} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{3}$.

22. 解:(1)见图



(2)记“此人身高在 $165cm \sim 170cm$ 之间”为事件 A .
依题意, 身高在 $160cm \sim 170cm$ 之间有 8 人, 从中随机抽取 1 人, 共有 8 个基本事件.
而身高在 $165cm \sim 170cm$ 之间有 6 人, 则事件 A 有 6 个基本事件.

根据古典概率公式可得概率 $P(A) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.

答: 此人身高在 $165cm \sim 170cm$ 之间的概率为 $\frac{3}{4}$.

23. 解:(1)若圆 C 关于直线对称, 则圆心 $C(-2, 1)$ 在直线 $l: ax + y - 1 = 0$ 上,
即 $-2a + 1 - 1 = 0$, 所以 $a = 0$.

(2)解法一:

由直线 l 与圆 C 的方程,

$$\begin{cases} ax + y - 1 = 0, \\ (x+2)^2 + (y-1)^2 = 3, \end{cases}$$

消去 y , 得 $(1+a^2)x^2 + 4x + 1 = 0$.

因为直线 l 与圆 C 有两个不同的交点,

则 $\Delta = 16 - 4(1+a^2) > 0$.

解得 $-\sqrt{3} < a < \sqrt{3}$.

解法二: 因为直线 l 与圆 C 有两个不同的交点, 则圆心 $C(-2, 1)$ 到直线 $l: ax + y - 1 = 0$ 的距离

$$d = \frac{|-2a + 1 - 1|}{\sqrt{a^2 + 1}} < \sqrt{3}, \text{解得 } -\sqrt{3} < a < \sqrt{3}.$$

24. 解:(1)证明: 在区间 $(0, +\infty)$ 内任意取两实数 x_1, x_2 ,

且 $0 < x_1 < x_2$,

$$\begin{aligned} \text{则 } f(x_1) - f(x_2) &= (\frac{1}{x_1} + 1) - (\frac{1}{x_2} + 1) = \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \\ &= \frac{x_2^2 - x_1^2}{x_1 x_2} = \frac{(x_2 + x_1)(x_2 - x_1)}{x_1 x_2}. \end{aligned}$$

由 $0 < x_1 < x_2$, 得 $x_1 + x_2 > 0, x_2 - x_1 > 0, x_1 x_2 > 0$,
于是 $f(x_1) - f(x_2) > 0$, 即 $f(x_1) > f(x_2)$.

所以, 函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上是减函数.

$$(2) \text{因为 } f(x) + \frac{1}{x} - \frac{1}{a} = \frac{1}{x^2} + 1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{a} \geq 0,$$

$$\text{所以 } \frac{1}{a} \leq \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1 = (\frac{1}{x} + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}. \quad (*)$$

由 $(*)$ 式对于一切 $x \in (-\infty, 0)$ 恒成立,

$$\text{故有 } \frac{1}{a} \text{ 小于等于 } [(\frac{1}{x} + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}] \text{ 的最小值.}$$

$$\text{又当 } x = -2 \text{ 时, } (\frac{1}{x} + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} \text{ 有最小值 } \frac{3}{4}.$$

$$\text{所以 } \frac{1}{a} \leq \frac{3}{4}.$$

解得 $a < 0$ 或 $a \geq \frac{4}{3}$.

吉林省 2016 ~ 2017 学年度高中必修课程复习与检测

数学综合 5

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8
C	B	B	C	D	B	A	B
9	10	11	12	13	14	15	
A	B	D	B	D	B	B	

二、填空题

16. 0.03; 3

17. $\frac{13\pi}{3}$

18. $2x - 3 = 0$ 或 $6x + 8y - 17 = 0$

19. ①②

三、解答题

20. 解:(1)根据条件 $a + b = \sqrt{2}c$, $a + b + c = \sqrt{2} + 1$,

$$\text{则 } a + b = \sqrt{2}, c = 1.$$

(2)因为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{6} \sin C$,

$$\text{所以 } ab = \frac{1}{3}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{1}{2},$$

因此 $C = 60^\circ$.

21. 解:(1)一共有 8 种不同的结果,列举如下:

(白、白、白), (白、白、黑), (白、黑、白), (黑、白、白),
(白、黑、黑), (黑、白、黑), (黑、黑、白), (黑、黑、黑).

(2)记“3 次摸球所得总分大于 4 分”为事件 A , 事件 A 包含的基本事件为:

(白、黑、黑), (黑、白、黑), (黑、黑、白), (黑、黑、黑),
事件 A 包含的基本事件数为 4, 由(1)可知, 基本事件总数为 8,

$$\text{所以事件 } A \text{ 的概率为 } P(A) = \frac{1}{2}.$$

22. 解: 设今后人口年平均增长率为 1% , 经过 x 年后, 我国人口数为 y 亿.

1999年底, 我国人口约 13 亿;

经过 1 年(2000 年), 人口数为 $13 + 13 \times 1\% = 13 \times (1 + 1\%)$;

经过 2 年(2001 年), 人口数为 $13 \times (1 + 1\%) + 13 \times (1 + 1\%) \times 1\% = 13 \times (1 + 1\%)^2$;
.....

所以, 经过 x 年, 人口数为 $13 \times (1 + 1\%)^x = 13 \times 1.01^x$ (亿);

当 $x = 20$ 时, $y = 13 \times 1.01^{20} \approx 16$ (亿).

所以, 经过 20 年后, 我国人口数最多为 16 亿.

23. 解:(1)因为 $a_1 = 1, S_3 = 7$, 所以 $a_1 + a_2 + a_3 = 7$,

$$\therefore a_1 + a_2 + a_3 = 7, \therefore 1 + q + q^2 = 7, \because q > 0,$$

$$\therefore q = 2, \therefore a_n = a_1 q^{n-1} = 2^{n-1}.$$

$$(2) \because a_n = 2^{n-1}, \therefore T_n = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2$$

$$= \frac{1 - 4^n}{1 - 4} = \frac{1}{3} (4^n - 1).$$

24. 解: 设点 M 的坐标是 (x, y) , 点 A 的坐标是 (x_0, y_0) .

由于点 B 的坐标是 $(4, 3)$, 且点 M 是线段 AB 的中点,
所以 $x = \frac{x_0 + 4}{2}, y = \frac{y_0 + 3}{2}$, 于是有 $x_0 = 2x - 4$,

$$y_0 = 2y - 3, \quad (1)$$

因为点 A 在圆 $(x + 1)^2 + y^2 = 4$ 上运动, 所以点 A 的坐标满足方程 $(x + 1)^2 + y^2 = 4$,

$$\text{即 } (x_0 + 1)^2 + y_0^2 = 4, \quad (2) \quad \text{把(1)代入(2),}$$

$$\text{得 } (2x - 4 + 1)^2 + (2y - 3)^2 = 4,$$

$$\text{整理, 得 } (x - \frac{3}{2})^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = 1.$$

所以, 点 M 的轨迹是以 $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$ 为圆心, 半径长是 1 的圆.

吉林省 2016 ~ 2017 学年度高中必修课程复习与检测

数学综合 6

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8
C	B	B	C	B	D	B	A
9	10	11	12	13	14	15	
B	A	A	B	A	D	A	

二、填空题

16. 圆锥

17. $\frac{2\pi}{3}$

18. 4

19. 3

(2)解法一:
在 Rt $\triangle EAD$,Rt $\triangle ECD$,Rt $\triangle ACD$ 中,
 $\therefore AD = CD = 1, ED = 1,$
 $\therefore AE = AC = EC = \sqrt{2},$
 $\therefore S_{\triangle EAD} = S_{\triangle ECD} = S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}.$
 $\therefore S_{\triangle EAC} = \frac{1}{2} AC \cdot AE \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$
 $\therefore S_{\triangle EAC} + S_{\triangle AEC} = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3+\sqrt{3}}{2}.$

解法二:
 $\because AD = CD = 1, AA_1 = 2, E$ 是 DD_1 中点,
 $\therefore AD = CD = DE = 1.$
 $\therefore AE = CE,$
 $\because O$ 是 AC 中点,
 $\therefore OE \perp AC.$
又 $BD_1 = \sqrt{AD^2 + CD^2 + DD_1^2} = \sqrt{6},$
 $\therefore OE = \frac{1}{2} BD_1 = \frac{\sqrt{6}}{2}.$
 $\therefore AC = \sqrt{AD^2 + CD^2} = \sqrt{2},$
 $\therefore S_{\triangle AEC} = \frac{1}{2} AC \cdot OE = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{6}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$
又 $S_{\triangle ADE} = S_{\triangle CDE} = S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2}.$
 \therefore 三棱锥 $D - AEC$ 表面积 $S_{\text{表}} = 3S_{\triangle ACD} + S_{\triangle AEC} = \frac{3+\sqrt{3}}{2}.$

22.解:(1)设数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ,
由已知 $a_1 = a_1 q^3 = 2q^3 = 16,$
 $\therefore q = 2.$
 $\therefore a_n = a_1 q^{n-1} = 2^n.$
(2)由(1)得, $a_3 = 8, a_5 = 32,$
 $\therefore b_3 = 8, b_5 = 32,$
设数列 $\{b_n\}$ 的公差为 d ,
则 $\begin{cases} b_1 + 2d = 8, \\ b_1 + 4d = 32. \end{cases}$ 解得: $\begin{cases} b_1 = -16, \\ d = 12. \end{cases}$
 $\therefore S_n = nb_1 + \frac{n(n-1)d}{2} = -16n + \frac{n(n-1) \times 12}{2} = 6n^2 - 22n.$

23.解:(1)由已知可得,圆心 $(-3, 1)$,半径长 $r = 2$.
 \therefore 弦长为 $2\sqrt{3},$
 \therefore 圆心到直线 l 的距离 $d = \sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 1.$
(2)设直线 l 的方程为 $y = k(x - 4)$,即 $kx - y - 4k = 0.$
圆心到直线 l 的距离为 $d = \frac{|-3k - 1 - 4k|}{\sqrt{1+k^2}} = 1,$
整理得: $k(24k + 7) = 0.$
解得: $k = 0$ 或 $k = -\frac{7}{24}.$
故所求直线 l 有两条,分别为: $y = 0$ 或 $y = -\frac{7}{24}(x - 4),$
即 $y = 0$ 或 $7x + 24y - 28 = 0.$

24.解:(1) $g(x) = f(x) + 3x = -x^2 + (2a + 3)x - a,$

$\because g(x)$ 是偶函数,

$\therefore g(-x) = g(x).$

$\therefore -x^2 - (2a + 3)x - a = -x^2 + (2a + 3)x - a.$

即 $2(2a + 3)x = 0$ 恒成立.

$\therefore 2a + 3 = 0, a = -\frac{3}{2}.$

(2)解法一:

二次函数 $y = f(x)$ 的对称轴为 $x = a$,图象开口向下,

①当 $a \leq 1$ 时, $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上是减函数,
 $\therefore f(x)_{\text{最大值}} = f(1) = a - 1 \leq 2$.解得: $a \leq 3.$
 $\therefore a \leq 1.$
②当 $a > 1$ 时, $f(x)_{\text{最大值}} = f(a) = a^2 - a \leq 2,$
即 $a^2 - a - 2 \leq 0$.得 $-1 \leq a \leq 2.$
 $\therefore 1 < a \leq 2.$
综上所述, a 的取值范围是 $a \leq 2.$

解法二:
 $\because f(x) \leq 2,$
 $\therefore -x^2 + 2ax - a \leq 2$,即 $a \leq \frac{x^2 + 2}{2x - 1} (x \geq 1).$
设 $\varphi(x) = \frac{x^2 + 2}{2x - 1},$
函数 $y = f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上, $f(x) \leq 2$ 恒成立等价于
 $\varphi(x)_{\text{最小值}} \geq a.$
 $\varphi(x) = \frac{x^2 + 2}{2x - 1}$
 $= \frac{(x - \frac{1}{2})^2 + (x - \frac{1}{2}) + \frac{9}{4}}{2(x - \frac{1}{2})}$
 $= \frac{1}{2}((x - \frac{1}{2}) + \frac{9}{4(x - \frac{1}{2})} + 1).$
 $\because x \geq 1,$
 $\therefore x - \frac{1}{2} > 0.$
 $\therefore \varphi(x) \geq \frac{1}{2}(2 \sqrt{(x - \frac{1}{2}) \times \frac{9}{4(x - \frac{1}{2})}} + 1)$
 $= \frac{1}{2}(3 + 1)$
 $= 2.$
当 $x - \frac{1}{2} = \frac{9}{4(x - \frac{1}{2})}$,即 $x = 2$ 时,取等号,
 $\therefore \varphi(x)_{\text{最小值}} = 2.$
 $\therefore a \leq 2.$

吉林省 2016 ~ 2017 学年度高中必修课程复习与检测

数学综合 7

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8
C	D	A	B	C	A	C	A
9	10	11	12	13	14	15	
B	D	A	A	B	B	D	

二、填空题

16. π

17. $\frac{1}{2}$

18. 33

19. 1

三、解答题

20.解:(1)由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$,得 $\frac{\sqrt{2}}{\sin 30^\circ} = \frac{b}{\sin 45^\circ},$

$\therefore b = 2.$

(2)由 $A = 30^\circ, B = 45^\circ, A + B + C = 180^\circ,$

$\therefore C = 105^\circ.$

又 $\because \sin 105^\circ = \sin(60^\circ + 45^\circ)$
 $= \sin 60^\circ \cos 45^\circ + \cos 60^\circ \sin 45^\circ$
 $= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4},$
 $\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times 2 \times \sin 105^\circ = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}.$

21.解:(1)证明:连接 A_1C_1 ,则 $B_1D_1 \perp A_1C_1$.
 $\because AA_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$,
 $B_1D_1 \subset$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$,
 $\therefore AA_1 \perp B_1D_1.$
又 $\because AA_1 \cap A_1C_1 = A_1$,
 $\therefore B_1D_1 \perp$ 平面 AA_1C_1 .
 $\therefore AC_1 \perp B_1D_1.$
(2)由 $\because AA_1 = 2, E$ 是 AA_1 的中点, $\therefore AE = 1.$
由已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 可知, $AE \perp$ 平面 ABD ,且 $AB \perp AD$,
 $A_1B_1C_1D_1$ 可知, $AE \perp$ 平面 ABD ,且 $AB \perp AD$,
 $\therefore V_{E - ABD} = \frac{1}{3} Sh = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times AB \times AD \times AE$
 $= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times 1 = \frac{2}{3}.$

22.解:(1)设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d .
 $\because a_3 + a_4 = 1, \therefore a_1 + 2d + a_1 + 3d = 1.$
又 $a_1 = -2, \therefore d = 1.$
由 $a_n = a_1 + (n - 1)d$ 得 $a_n = -2 + (n - 1) \times 1$,
整理得 $a_n = n - 3.$
(2)由 $a_n = n - 3$ 可得 $a_{15} = 15 - 3 = 12.$
 $\therefore S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2},$
 $\therefore S_{15} = \frac{15 \times (-2 + 12)}{2} = 75.$

23.解:(1)由 \because 直线 AB 的倾斜角 $\alpha = 45^\circ, \therefore k_{AB} = 1.$
又因为直线 AB 过点 $P(-1, 2)$,
由直线方程的点斜式: $y - y_0 = k(x - x_0)$,
得直线 AB 的方程为 $y - 2 = 1 \times (x + 1)$,整理得 $x - y + 3 = 0.$

由圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 2y - 7 = 0$ 可知,
圆心坐标为 $C(1, 1)$,

\therefore 圆心 C 到直线 AB 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|1 - 1 + 3|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

(2)由 \because 弦 AB 被点 P 平分, $\therefore AB \perp CP.$

$$\therefore k_{AB} = -\frac{1}{k_{PC}} = 2.$$

\therefore 直线 AB 的方程为 $y - 2 = 2 \times (x + 1)$,

整理得 $2x - y + 4 = 0.$

24.解:(1)当 $k = 4$ 时,函数 $f(x) = 2x^2 - 4x - 8$,
函数图象开口向上,对称轴方程为 $x = 1$.

\therefore 函数 $f(x) = 2x^2 - 4x - 8$ 的单调递减区间为 $(-\infty, 1]$,
单调递增区间为 $[1, +\infty)$.

(2)函数 $f(x) = 2x^2 - kx - 8$ 的对称轴方程为 $x = \frac{k}{4}$,图象开口向上.

①当 $k < -4$,即 $\frac{k}{4} < -1$ 时,函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 2]$ 上单调递增.

此时 $g(k) = f(-1) = 2 + k - 8 = k - 6$.

②当 $-4 \leq k \leq 8$,即 $-1 \leq \frac{k}{4} \leq 2$ 时,函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 2]$ 上单调递减,在区间 $[\frac{k}{4}, 2]$ 上单调递增.

此时 $g(k) = f(\frac{k}{4}) = 2 \times \frac{k^2}{16} - \frac{k^2}{4} - 8 = -\frac{k^2}{8} - 8.$

③当 $k > 8$,即 $\frac{k}{4} > 2$ 时,函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 2]$ 上单调递减.

此时 $g(k) = f(2) = 8 - 2k - 8 = -2k$.

$\begin{cases} k = -6, k < -4, \\ -2k, k > 8. \end{cases}$

综上: $g(k) = \begin{cases} -\frac{k^2}{8} - 8, -4 \leq k \leq 8, \\ -2k, k > 8. \end{cases}$

